

ADR- Defense (cimetidine) 300mg/tab 之不良反應及使用警語 101.10.5

回報之不良反應：(回報者 謝維恭藥師)

患者吃藥物後，頭暈想吐。

Defense (cimetidine) 300mg/tab：

Cimetidine 對於基礎胃酸分泌(basal gastric secretion)與食物，組織胺，Pentagastrin，Caffeine 及Insulin 等刺激物所引起之刺激性胃酸分泌(Stimulated gastric secretion) 均可確實抑制之。

一、不良反應：

暫時性的下痢、疲倦、暈眩、發疹、少數男性女乳症，此症狀可因停藥而消失。

二、注意事項：

1. 如患者腎臟機能有障礙時(Creatinine clearance 低於30ml/min)劑量宜減低，因在循環中Cimetidine level 會被血液滲析所降低，因此Cimetidine須於滲析最後階段才服用。
2. 對於孕婦或受胎婦人宜慎重投與。
3. 使用Coumarin 型的抗凝血劑的患者，於隨著服用本藥會呈現Prothrombin time 更加延長。故當此兩種藥物同時服用時，抗凝血劑的劑量須減低。
4. 本藥對腎機能不全或腦綜合病症的老年人或重症患者，有輕微精神混亂的現象發生，但停藥後24 小時內可恢復正常。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師