

**ADR- Ultracet (tramadol hydrochloride 37.5mg + acetaminophen 325mg) 之
不良反應及使用警語 101.9.7**

回報之不良反應：(回報者 謝維恭藥師)
患者吃藥物後，出現口乾、嘔吐情況。

Ultracet (tramadol hydrochloride 37.5mg + acetaminophen 325mg)：
使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

一、不良反應：

最常被報告的不良反應為噁心、暈眩及嗜眠。

二、注意事項：

1. 之前曾對 tramadol、acetaminophen、本品其它成份或鴉片過敏的病人,不能使
用本品。若發生酒精、助眠藥、麻醉藥、中樞作用止痛劑、鴉片或精神藥物急性
中毒亦不得使用本品。
2. 服用選擇性 serotonin 再吸收抑制劑(SSRI 抗鬱劑或食慾抑制劑)、三環抗鬱劑
(TCAs)及其它三環化合物(如 cyclobenzaprine、promethazine 等)或鴉片的病人, 併
服 tramadol 會增加癲癇發作的危險性。
3. 併用大劑量 tramadol 與麻醉藥物或酒精可能會發生呼吸抑制。
4. 突然停用 tramadol 可能會發生戒除症狀, 臨床經驗建議逐漸減少劑量可減輕
戒除症狀。
5. 腎功能不全病人使用本品之情形未有研究。肌酐廓清率小於 30mL/min 的
病人,建議增加本品的給藥間隔,每 12 小時不要超過兩錠。
6. 不建議本品用於嚴重肝功能不全病人。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師