

ADR- Flucil Granules 40mg/g (Acetylcysteine) 之不良反應及使用警語 101.8.28

回報之不良反應：(回報者 謝維恭藥師)

患者吃藥物後，發生身體皮癢，皮膚出現疹子。

Flucil Granules 40mg/g (Acetylcysteine)：

Acetylcysteine為一具有活性Sulfahydril Group之氨基酸衍生物，口服後能直接與粘液蛋白中之Disulfide Linkage產生置換反應，使龐大的粘液蛋白分解成微小分子，因而減低痰之粘稠度，使痰易於咳出

一、不良反應：

- 1.消化器: 偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微臭氣(硫黃臭)等症狀出現。
- 2.過敏症 :有發疹等過敏症狀出現時應中止使用 C.其他 :血痰、惡寒、發熱、鼻漏、口內炎等。

二、注意事項：

1. 一般的注意:有支氣管分泌物增加時應小心觀察，若有自然喀出困難之場合，應行機械的吸引與體位變換等適當之處置。
2. 慎重投與：A. 支氣管氣喘、呼吸機能不全之患者(支氣管痙攣所引起，若認為有異常時，應中止使用，並作支氣管擴張劑投與等適切之處置)。 B.高齡者。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師