

## ADR- Purfen(Ibuprofen) 400mg/tab 之不良反應及使用警語 101.10.10

回報之不良反應：(回報者 陳美玲 護理長)

患者吃藥物後，皮膚癢，眼睛及嘴唇腫，聲音嘶沙啞。

### **Purfen(Ibuprofen) 400mg/tab：**

Purfen(Ibuprofen)能有效的抑制白血球的流動、阻止組織胺(Histamine)自肥大細胞釋出，同時亦抑制前列腺素(prostaglandin)的生成、及捕捉體內游離基如O<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>等而達到效果。Purfen(Ibuprofen)作用於中樞神經系統，提高疼痛閾值，減輕腦內的疼痛認知能力，因而達到止痛效果。

### 一、不良反應：

噁心、嘔吐、胃灼熱、胃痛、消化性潰瘍、皮疹、水腫、頭暈、頭痛。

### 二、注意事項：

- 1.儘量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
- 2.本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於感染所引起之炎症，必須合併使用適當之抗菌劑。
- 3.對於大量脫水病人應小心使用，因此藥主要由腎臟排泄。
- 4.請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
- 5.氣喘、消化道潰瘍病史、肝腎受損者、老人、高血壓、心肺功能不全患者及使用抗凝血藥物者須注意服用。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師