

ADR- Finska-LP (Pseudoephedrine120mg + Loratadine 5mg) Tab之不良反應及使用警語 101.8.22

回報之不良反應：(回報者 唐麗光 醫師)
患者吃藥物後(1[#] bid)，發生無法解尿情形。

Finska-LP (Pseudoephedrine120mg + Loratadine 5mg) Tab：

Pseudoephedrine 為一種天然的麻黃鹼，口服具有血管收縮作用，上呼吸道之充血粘膜收縮，而逐漸且持續的解除充血現象，因對交感神經之作用而解除呼吸道粘膜壁之充血現象。

一、不良反應：

1. 神經過敏、暈眩、噁心、厭食、口渴、心跳過速、搔癢、紅疹、蕁麻疹、耳鳴、精神亢奮、高血壓、心悸、偏頭痛、支氣管痙攣、排尿困難。

二、注意事項：

1. 擬交感神經作用藥物應小心使用於青光眼，消化性潰瘍狹窄，幽門十二指腸阻塞，前列腺肥大或膀胱頸阻塞，心血管疾病，眼內壓增高或糖尿病的病人。
2. 擬交感神經藥物應小心使用於同時接受Digitalis治療的病人。
3. 擬交感神經藥物可能會引起中樞神經刺激、興奮、或痙攣的作用及(或)產生低血壓合併心臟血管性虛脫。
4. 對於年紀大於60歲以上的病患，應小心服用，因為擬交感神經藥物很可能會引起諸如迷惑、幻覺、痙攣、中樞神經系統抑制，甚至死亡的副作用，故連續使用本藥品的年老病患，應提高警覺。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師