

傷寒疫苗 (Typhoid Vaccine)

傷寒傳播方式：主要透過受汙染的食物、飲水傳染。

感染症狀：潛伏期長短會受到感染菌量的多寡影響，一般為介於 8~14 天(但最大區間可能介於 3~60 天不等)，症狀為持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、便秘或腹瀉、相對性心律減慢、肝脾腫大、身軀出現紅疹等。

預防方式：注意飲食衛生(盡量熟食、飲用瓶裝水或飲料)，可視需求接種傷寒疫苗。

傷寒高風險地區：傷寒是全球性的疾病，全世界都有病例，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區，特別容易引發流行。南亞地區感染風險最高，另外東南亞、非洲、中南美洲、加勒比海群島等地區也有較高的感染風險。一般觀光、短期商務旅客感染傷寒的風險較低，注意飲食安全即可，但如果程中會前往非一般觀光區、較偏僻或衛生條件較差小型都市、村落的旅客(如探親、志工活動、背包客)，感染風險較高，建議估接種疫苗的需求，但接種後同樣必須注意飲食安全。

傷寒疫苗簡介

傷寒疫苗是一種不活化疫苗，現用疫苗是純化傷寒桿菌的細胞壁多醣體製成。

單劑接種(0.5 ml)，採肌肉注射或皮下注射，接種後約 14 天可產生保護力，保護力約可維持 2~3 年，如持續暴露於高風險環境，可考慮每 3 年追加接種一劑疫苗。

疫苗接種禁忌(contraindications)

1. 未滿 2 歲之嬰幼兒。
2. 對疫苗成分過敏者。

• 需特別留意的接種對象(precautions)

1. 免疫力不全患者、或正在接受免疫抑制治療者。
2. 孕婦。
3. 正處於高燒或罹患嚴重慢性疾病者，宜待病情穩定後再接種。

• 不良反應及副作用

1. 注射部位的局部反應，如：紅、腫、疼痛。
2. 罕見的一般性反應，如：發燒、倦怠、頭痛、關節痛、肌肉痛、噁心、腹痛。
3. 極少見的過敏反應，如：搔癢、疹子、蕁麻疹。

* 現用疫苗廠牌、品名、產製國、許可證號：Sanofi Pasteur / TYPHIM Vi™/ 法國 / 專案進口疫苗