

B 型肝炎疫苗(HEPATITIS B)

◎疾病簡介

B 型肝炎是肝炎的一種，當肝臟受到病毒、細菌或寄生蟲之感染，或因酒精中毒、藥物或化學物質等之傷害，使肝組織內發生肝細胞變質、壞死、白血球浸潤等炎症反應，稱為肝炎，由 B 型肝炎病毒所引起的肝炎叫「B 型肝炎」。

B 型肝炎是經由含有 B 型肝炎病毒的血液或體液透過皮膚或黏膜進入體內而感染。其途徑包括：輸血、打針、血液透析、針灸、刺青、紋眉、穿耳洞及共用牙刷或刮鬍刀時、性行為的感染。帶原者的陰道分泌物、唾液及精液中可能帶有 B 型肝炎病毒，但平常不至因此造成感染，但病毒濃度高時則仍有可能引起感染。

◎認識疫苗

B 型肝炎疫苗是一種不活化疫苗，含有經純化的 B 型肝炎表面抗原，接種後使人體產生 B 肝表面抗體以預防 B 型肝炎病毒感染。

◎自費接種建議

1. 未曾接種 B 型肝炎疫苗接種者：經檢驗如未具 B 肝表面抗體亦未成為 B 肝帶原者，建議依「0-1-6 個月」之時程接種 3 劑。
2. 已依時程完成 B 型肝炎疫苗接種者，經檢驗為 B 型肝炎表面抗體陰性 (<10 mIU/ml) 者：

(1) 若為 B 型肝炎感染高危險群，可自費追加 1 劑 B 型肝炎疫苗，1 個月後再抽血檢驗，若表面抗體仍為陰性，可以採「0-1-6 個月」之時程接續完成。

* 高危險群包括血液透析病人、器官移植病人、接受血液製劑治療者、免疫不全者；多重性伴侶、注射藥癮者；同住者或性伴侶為帶原者；身心發展遲緩收容機構之住民與工作者；可能接觸血液之醫療衛生等工作人員等，應接種疫苗。

(2) 若非 B 型肝炎感染高危險群，尚無須全面再追加 1 劑 B 型肝炎疫苗。惟個案可自費追加 1 劑。

◎**接種禁忌**：先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。

◎**注意事項**：發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。