

ADR- Flagyl (Metronidazole) 250mg/tab 之不良反應及使用警語 101.8.29

回報之不良反應：(回報者 謝維恭藥師)

患者吃藥物後，出現頭暈噁心。

Flagyl (Metronidazole) 250mg/tab：

本藥為一種殺菌劑，可用於專一性厭氣菌感染的治療，其作用是經由厭氣性細菌代謝所獨有的機轉而使本藥在細胞內進行化學性還原反應。被還原後之本藥具有細胞毒，它可與DNA相互作用，導致螺旋結構的喪失，股的斷裂，其結果乃抑制核酸之合成，而使細胞死亡。

一、不良反應：

噁心、腹瀉、不愉快的金屬味覺、痙攣性發作、紅斑性皮膚疹、血栓靜脈炎、排尿困難。

二、注意事項：

1. 患有血液疾病之患者（可能會有白血球減少之症狀出現）。
2. 對於孕婦或受胎婦人宜慎重投與，懷孕用藥級數：B。
3. 曾有痙攣性發作和肢端感覺異常或麻痺現象之週邊神經病變。
4. 投用本藥後，可能會干擾血清中ALT(SGPT)、AST (SGOT)、LDH的檢驗結果。
5. 本藥不能和酒精併用，由於它干擾酒精之氧化作用，會導致 Acetaldehyde 的積聚而產生類似 Disulfiram 的作用，如腹部痙攣、噁心、嘔吐、頭痛或潮紅；此外，當酒精與本藥併用時，酒精飲料的味覺會改變。

資料來源：藥品仿單

資料整理：謝維恭 藥師